

# Tableau de précautions additionnelles

« Les mesures recommandées sont formulées à la lumière des données scientifiques disponibles à ce jour et les recommandations d'experts d'instances scientifiques internationales reconnues concernant le coronavirus. Elles sont ajustées selon l'évolution épidémiologique et les nouvelles connaissances. » (CINQ, 2020)

Mise à jour : 2020-04-05

COVID-19	Mesures de prévention et contrôle des infections	Hygiène et salubrité
<p><b>Urgence</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé</p>	<p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Port du masque de procédure pour l'utilisateur; <i>(Si l'utilisateur est accompagné, évaluer si cette ou ces personnes présente(nt) des symptômes d'une infection compatible avec le COVID-19. Si tel est le cas, elle(s) doit (vent) être considérée(s) comme possiblement infectée(s) et être référée(s) pour une évaluation médicale. Elle(s) doit (vent) porter un masque de procédure).</i></li> <li>Placer l'utilisateur dans une pièce fermée avec son accompagnateur.</li> </ol> <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pour toute personne qui entre dans la pièce, appliquer les précautions additionnelles appropriées en fonction des critères suivants :                     <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Gouttelettes, contact et protection oculaires (masque de procédure)</b> pour tous les cas à l'urgence (couché sur civière ou non) et les cas hospitalisés sans critère d'admission en soins intensifs.</li> <li><b>Aérienne, contact et protection oculaire (masque N95)</b> si l'utilisateur présente l'une ou l'autre des conditions suivantes : Présence d'un critère d'admission en soins intensifs parmi les suivants:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Adultes :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence respiratoire <math>\geq 24</math>/min ou détresse respiratoire aiguë</li> <li>Besoin de <math>\geq 4L</math> en oxygène (lunettes nasales ou VM) pour saturation 90 %</li> <li>TA systolique <math>&lt; 90</math> mmHg malgré une réanimation liquidienne adéquate</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porter l'ÉPI requis indiqué sur l'affichette à l'entrée de la chambre de l'utilisateur pour l'entretien quotidien, ainsi que le type de désinfection</li> <li>Lors de la désinfection terminale de la chambre, respecter le temps d'attente requis selon le nombre d'échanges d'air à l'heure avant d'entrer dans la pièce sans protection respiratoire et oculaire (en aérien)</li> <li>En absence de validation du nombre d'échanges d'air à l'heure de la pièce à désinfecter, respecter un <b>6 heures</b> avant de procéder la désinfection de la pièce. Le délai d'attente débute lorsque l'utilisateur quitte la pièce et rideaux et draps sont retirés</li> <li>Pour la désinfection terminale en précautions gouttelettes/contact/protection oculaire, aucun temps d'attente n'est requis, donc protection respiratoire</li> </ul>

COVID-19	Mesures de prévention et contrôle des infections	Hygiène et salubrité
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout critère jugé sévère par le clinicien (ex. : altération de l'état de conscience)</li> <li>ii. Enfants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toux ou difficultés respiratoires avec au moins un des symptômes suivants</li> <li>• Cyanose centrale ou saturation &lt; 90 % à l'air ambiant</li> <li>• Détresse respiratoire sévère</li> <li>• Signes de pneumonie avec diminution marquée de l'état général (ex. : incapacité de boire, léthargie, perte de conscience, convulsions)</li> </ul> </li> <li>iii. Lors de la réalisation d'une intervention médicale générant des aérosols (IMGA). <i>(L'écouvillonnage nasopharyngée et les traitements de nébulisation chez l'adulte ne sont pas une procédure faisant partie des interventions considérées comme procédures à risque d'augmenter la transmission du SRAS-CoV-2).</i></li> </ul> <p><b>Étape 3</b></p> <p>1- Procéder à la procédure interne d'investigation et des indications de prélèvements pour la COVID-19 en Montérégie.</p>	<p>et oculaire non nécessaire pour l'employé.</p>
<p><b>Hôpital : unité de soins</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé hospitalisé</p>	<p>Précautions additionnelles : <b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b> (masque de procédure) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Cas suspectés ou confirmés de Covid-19 qui sont <b>sans critère</b> d'admission en soins intensifs.</li> <li>2- Cas hospitalisés en raison d'un diagnostic autre que le Covid-19 (ex. : fracture de hanche), mais ayant reçu un résultat <b>Positif</b> pour le covid-19 (cas non sévères qui ne nécessitent pas d'IMGA).</li> </ol> <p>Précautions additionnelles : <b>Aériens/contact/protection oculaire</b> (masque N95) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Cas <b>suspects ou confirmés</b> COVID-19 hospitalisés en raison de symptômes compatibles avec la COVID-19 et <b>nécessitant une IMGA</b> (section Interventions médicales générant des aérosols).</li> <li>2- Cas <b>suspectés ou confirmés</b>, hospitalisés en raison de symptômes compatibles avec la Covid-19 <b>avec des critères d'admission en soins intensifs</b>.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous référer aux indications de l'urgence.</li> </ul>

COVID-19	Mesures de prévention et contrôle des infections	Hygiène et salubrité
<p><b>CHSLD/ URFI (dans les CHSLD)</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation, un cas probable ou cas confirmé ou une nouvelle admission</p>	<p><b>Mesures pour les travailleurs de la santé</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Application des précautions additionnelles dès l'entrée dans la chambre de l'utilisateur ou lorsqu'à moins de 2 mètres : <b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b> (masque de procédure)</li> <li>2. Application des précautions additionnelles <b>Aériens/contact/protection oculaire</b> (masque N95) lors de la réalisation d'interventions médicales générant des aérosols (IMGA)</li> </ol> <p>Vous référer à la procédure : Mesures spécifiques pour la gestion de cas de COVID-19 en CHSLD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter l'ÉPI requis indiqué sur l'affichette à l'entrée de la chambre de l'utilisateur pour l'entretien quotidien, ainsi que le type de désinfection</li> <li>• Lors de la désinfection terminale de la chambre d'un usager en précaution gouttelettes/contact/protection oculaire, sans délai d'attente et sans protection oculaire et respiratoire.</li> <li>• En absence de données au regard du nombre d'échanges d'air à l'heure de la pièce à désinfecter, respecter un <b>6 heures</b> avant de procéder pour les précautions aériennes/contact sans protection oculaire et respiratoire. Le délai d'attente débute lorsque l'utilisateur quitte la pièce et rideaux et draps sont retirés.</li> </ul>
<p><b>SAD</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé</p>	<p><b>Mesures pour les travailleurs de la santé</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Application des précautions additionnelles dès l'entrée dans la chambre de l'utilisateur ou l'endroit où seront offerts les soins ou lorsqu'à moins de 2 mètres de l'utilisateur (masque de procédure): <b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b></li> <li>2. <b>Application des précautions additionnelles Aériens/contact/protection oculaire</b> (masque N95) lors des interventions lors de la réalisation d'interventions médicales générant des aérosols (IMGA)</li> </ol> <p>Limiter ces interventions à celles qui sont absolument essentielles. Réévaluer les indications de soins au besoin.</p>	

COVID-19	Mesures de prévention et contrôle des infections	Hygiène et salubrité
<p><b>Cliniques médicales/ Cliniques externes/ CDD/ CDE/ GMF</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé.</p>	<p><b>Mesures pour l'usager</b></p> <p>1. Port du masque de procédure pour l'usager symptomatique (considérer que les accompagnateurs symptomatiques devraient également porter le masque de procédure);</p> <p><b>Mesures pour les travailleurs de la santé</b></p> <p><b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b> ou lorsqu'à moins de 2 mètres de l'usager (masque de procédure)</p> <p><i>(L'écouvillonnage nasopharyngée et les traitements de nébulisation chez l'adulte ne sont pas une procédure faisant partie des interventions considérées comme procédures à risque d'augmenter la transmission du SRAS-CoV-2 (COVID-19))</i></p> <p>CDD : Vous pouvez conserver la blouse à manches longues jetable, le masque de procédure et la visière entre les usagers. Par contre, vous devez changer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter l'ÉPI</li> <li>• Entre chaque usager suspecté, nettoyer et désinfecter la salle d'examen</li> <li>• Pour la salle d'attente, effectuer une désinfection des «high touch» selon une fréquence déterminée selon l'achalandage de la clinique</li> </ul>
<p><b>Maisons de répit</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé.</p>	<p>1- Appliquer, pour tous les travailleurs, les mesures de prévention et protection recommandées par le service de PCI des établissements</p> <p>2- Application des précautions additionnelles dès l'entrée dans la chambre de l'usager ou lorsqu'à moins de 2 mètres :</p> <p><b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b> (masque de procédure)</p> <p>3- Privilégier une équipe dédiée pour cette clientèle</p> <p>4- Réserver les équipements de protection individuelle aux équipes dédiées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procéder au nettoyage à l'aide de l'application d'une solution javellisée et fraîchement préparée</li> <li>• Nettoyer les surfaces et objets fréquemment touchés</li> <li>• Nettoyer, dès qu'il y a des souillures, les surfaces et les objets contaminés</li> </ul>

COVID-19	Mesures de prévention et contrôle des infections	Hygiène et salubrité
<p><b>RAC/ RI/ RTF</b></p> <p>Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas probable ou cas confirmé</p>	<p>1- Appliquer, pour tous les travailleurs, les mesures de prévention et protection recommandées par le service de PCI des établissements</p> <p>2- Application des précautions additionnelles dès l'entrée dans la chambre de l'usager ou lorsqu'à moins de 2 mètres :</p> <p><b>Gouttelettes/contact/protection oculaire</b> (masque de procédure)</p> <p>Voir la directive RI RTF 2020-03-22 du MSSS</p>	

*Références : INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures de PCI pour les cliniques médicales, cliniques externes, cliniques COVID-19 et GM, CINQ, version 1. INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures de PCI pour les milieux de soins aigus : recommandation intermédiaires, CINQ, version 5.0. 2020-03-27. INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour aînés : recommandations intérimaires, CINQ, version 2.0 2020-03-27., MSSS (2020), Coronavirus Covid-19, consignes pour le soutien à domicile, 2020-03-20., MSSS (2020), Coronavirus Covid-19, Consignes pour les maisons de répit, 2020-03-20. MSSS (2020), Directives RI RTF, 2020-03-22. INSPQ (2020), COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile : recommandation intérimaires, version 1.1, 2020-03-26, MSSS (2020), Port du masque de procédure en milieu de soins lors d'une transmission communautaire soutenue, INSPQ, 3 avril 2020.*